

トカインに対する気道過敏反応はサイトカインの点鼻により誘導し、気道平滑筋細胞表面のIL-13受容体発現はFACSで測定した。

**【結果】** JNK2<sup>-/-</sup>マウスではOVAにより誘導される気道過敏反応の抑制が認められた。肺胞洗浄液(BALF)中のIL-4、IL-13レベルは低下していた。また、OVA特異的IgE抗体の抑制が見られた。IL-4あるいはIL-13を点鼻し気道過敏反応を調べたところ、WTマウスとの差は見られなかった。さらにOVAとIL-13を同時に点鼻したところ、WTと同程度の気道過敏反応がJNK2<sup>-/-</sup>マウスで誘導された。また、IL-13&alpha;1受容体を発現する気道平滑筋細胞の割合に差は見られなかった。以上の結果よりJNK2<sup>-/-</sup>マウスにおける気道過敏反応の抑制はIL-13に対する気道平滑筋の反応性の差ではなく、IL-13の産生が抑制されたことによると思われた。

#### P1-5.

#### イミキモド誘導性乾癬モデルにおけるストレス応答性MAPキナーゼASK1の役割

(医学部医学科3年)

○川口謙太郎、堀内由莉乃

(医学総合研究所免疫制御研究部門)

溝口 出、金子幸太郎、角田 廉  
千葉祐規乃、樋口 要、善本 隆之  
(皮膚科)

前田 龍郎、川口 敦子、原田 和俊  
大久保ゆかり、坪井 良治

(総合診療科・さがみはらファミリークリニック)

水上 潤哉

(免疫学)

水口純一郎

乾癬の皮疹は、厚い鱗屑を伴う角化性紅斑局面からなる。Th17細胞依存性の慢性炎症性角化症で、表皮角化細胞の最終分化阻害と増殖亢進によると考えられている。最近、抗ウイルス薬イミキモド(IMQ)の頻回塗布により誘導する皮膚炎症が、マウス乾癬モデルとして汎用されている。また、乾癬炎症部位では、ストレス応答性MAPキナーゼp38発現が病態変化と相関し、さらに、p38阻害剤が炎症抑制効果を示すことが報告された。ASK1は、このp38シグナルの上流に位置するMAPキナーゼで、細胞死

や炎症性サイトカイン産生の誘導に関与し、角化細胞の分化促進作用も有している。そこで、本研究では、ASK1欠損マウスを用いて、IMQ誘導性乾癬の発症や病態形成におけるASK1の役割について検討を行った。

野生型およびASK1欠損マウスの除毛した背部にIMQを6日間連続塗布すると、経時的に皮膚の紅斑や鱗屑、肥厚が顕著になり乾癬様の症状を発症した。この時、野生型に比べASK1欠損マウスでは、これらの炎症スコアは有意に高く、組織学的解析でも表皮の肥厚や浸潤細胞の増加が見られた。さらに、炎症皮膚からRNAを抽出しリアルタイムRT-PCRを行ったところ、ASK1欠損マウスでは、IL-22やIL-17、TNF-α、CXCL1などの発現が増加していた。次に、IMQを1回塗布24時間後の皮膚の組織学的解析を行うと、細胞死が誘導されたTunel陽性細胞の数は殆ど変わらなかつたが、ASK1欠損マウスでKi67陽性の増殖性細胞数が増加していた。

以上より、ASK1は、乾癬発症時に炎症性サイトカイン産生の誘導ではなく、乾癬発症に抑制的と考えられる表皮角化細胞の正常な分化誘導の維持に働いている可能性が明らかになった。これらより、乾癬患者において、ASK1発現や活性化を増強することが乾癬の新しい治療に繋がる可能性が示唆される。

#### P1-6.

#### ビタミンK類の免疫抑制作用

(大学: 東京薬科大学臨床薬理学教室)

○畠中 浩成、杉山健太郎、平野 俊彦

**【背景】** ビタミンK(VK)類は、本来のVKとしての作用の他、抗腫瘍効果等の生物活性を有することが知られている。しかし、VK類の免疫系に対する効果についてはこれまでほとんど報告がない。そこで本研究では、VK類の免疫抑制作用について、健常者末梢血単核細胞(PBMC)を用いて検討した。

**【方法】** 健常者8名(男性4名、女性4名、平均年齢30.8歳)の静脈血20mLをヘパリン採血した。細胞分離液を用いて、ヘパリン血からPBMCを分離し、検体とした。T細胞マイトゲン(増殖因子)および種々の濃度のVK1、VK2、VK3、またはVK5の存在下に細胞を4日間培養し、細胞増殖率