

standard group. Lower STS score (OR: 1.69; 95% CI: 1.06-2.72, $p=0.029$), full independent ADL (OR: 6.90; 95% CI: 1.08-43.5, $p=0.041$), higher mean pressure gradient between aorta and left ventricle measured by echocardiogram (OR: 1.62; 95% CI: 1.05-2.50, $p=0.029$) and femoral access (OR: >100; 95% CI >1.54, $p=0.040$) were identified as significantly higher possibility of ED.

Conclusion: Completely independent ADL, lower STS score, pre-procedural higher pressure gradient and femoral access were independent possible factor for ED. This study implied possible future strategy for TAVI in Japan.

P3-49.

再灌流に成功した ST 上昇型心筋梗塞における QRS スコアの推移と 1 ヶ月後の心機能の相関に関する検討

(茨城: 循環器内科)

○小松 靖、東谷 迪昭、大嶋桜太郎
木村 一貴、阿部 憲弘、柴 千恵
田中 宏和

【背景】 初回前壁心筋梗塞の梗塞サイズと QRS スコアが相関する、あるいは QRS スコアが高いほど急性期の経皮的冠動脈血行再建術において、最終の MBG (myocardial brush grade) が低い傾向になることが報告されている。しかしながら、再灌流後の QRS スコアの推移と再灌流 1 ヶ月後の心機能の相関に関する報告はない。

【目的】 再灌流に成功した発症 24 時間以内に受診となった ST 上昇型心筋梗塞連続症例における QRS スコアの推移と 1 ヶ月後の心機能の相関に関する検討を行うこと。

【方法】 2012 年 5 月 6 日より 2016 年 1 月 1 日までに緊急入院となった初回の ST 上昇型心筋梗塞患者連続 45 症例に対して回帰的に検討した。

【結果】 男性 78% (35 名)、平均年齢は 68.1 ± 12.5 歳、発症から再灌流までの平均時間は 280 分 (最小値: 52 分、最大値: 1,438 分)、責任病変; 左前下行枝 56% (25 名)、左回旋枝 11% (5 名)、右冠動脈 33% (15 名)、CPK2354 ± 2104 IU/dl、受診時の心エコーにおける LVEF $53.5 \pm 8.6\%$ 、1 ヶ月後の LVEF

$60.3 \pm 8.0\%$ と有意に上昇していた ($P < 0.01$)。1 ヶ月後の LVEF と QRS スコアの相関 (Spearman 法) をそれぞれ検討したところ、受診時 $r = -0.633$ 、血行再建 24 ± 12 時間後 $r = -0.615$ 、血行再建 7 ± 3 日後 $r = -0.018$ 、血行再建 30 ± 7 日後 $r = -0.582$ と有意差をもって受診時の QRS スコアが最も相関を示した。また受診時の QRS スコアが 5 以上の群は 5 未満の群と比較し、1 ヶ月後の QRS スコアが悪化する傾向を認めた ($P < 0.01$)。

【考察】 血行再建後に Q 波が形成され、QRS スコアが悪化しても受診時の QRS スコアが良好であった症例は慢性期も心機能が保たれる可能性が示唆された。

【結語】 1 ヶ月後の心機能と QRS スコアの相関を検討すると受診時の QRS スコアが最も相関していた。

P3-50.

インスリン療法にて血糖・体重コントロールが不十分な 2 型糖尿病患者における SGLT2 阻害薬の併用効果

(八王子: 糖尿病・内分泌・代謝内科)

○永田 卓美、小暮晃一郎、梶 邦成
小林 高明、松下 隆哉、大野 敦
(高村内科クリニック)
高村 宏、植木 彬夫

【目的】 SGLT2 阻害薬 (Si) では体重減少効果が期待される一方、インスリン治療では体重増加の苦渋例も多い。そこで血糖・体重コントロールが不十分なインスリン療法中の 2 型糖尿病患者に Si を投与し、その併用効果を検討した。

【方法】 インスリン療法中も HbA1c が 8% 以上あるいは BMI30 以上の 2 型糖尿病患者 48 名 (平均年齢 51.5 歳、BMI29.1) に Si を投与し、投与前後の HbA1c、体重、脂質、血圧、eGFR、使用インスリン量、Si 以外の併用経口血糖降下薬 (OHA) の推移を検討した。

【結果】 Si の投与前後の HbA1c: $9.2 \rightarrow 8.1\%$ 、体重: $76.8 \rightarrow 74.8$ kg、TG: $257.2 \rightarrow 206.0$ mg/dl、インスリン投与量: $30.5 \rightarrow 27.4$ U、併用 OHA 数: $1.79 \rightarrow 1.41$ 剤と有意に減少した。

【総括】 インスリン療法にて血糖・体重コントロー

ルが不十分な患者に Si を追加したが、HbA1c の改善とともに体重や TG の減少も認め、同時にインスリン量や併用 OHA も減らすことができた。

P3-51.

地域病院における 1 型糖尿病患者への Sensor augmented pump 導入の実際

(戸田中央総合病院：初期臨床研修医)

○神田 遼弥

(戸田中央総合病院：一般内科)

楊 傑仲、藤村 佳世、池内 佑一

石川 卓也、藤田 知子、田中 彰彦

【背景・目的】 DCCT/EDIC 試験等の臨床試験が示されたことで、1 型糖尿病患者の血糖コントロールの重要性は広く知られるところとなった。もはやインスリン治療により 1 型糖尿病患者の生命を維持することは前提となり、治療の主眼は合併症予防となった。糖尿病治療を行う医療従事者にとって、合併症予防が至上命題の相を呈している。しかし、インスリン分泌能が枯渇している 1 型糖尿病患者の血糖コントロールを長期間維持することはしばしば困難を伴う。コントロール悪化の代表的な原因は、インスリン必要量の時間変動と日常生活における治療負担である。解決策として近年、欧米を中心にインスリンポンプや持続血糖モニタリングシステムなど、様々な医療機器の開発が進んでおり、糖尿病患者にとって福音となっている。既に海外臨床試験は、従来法である自己血糖測定+インスリン頻回注射群と比し、新たなデバイスを使用したインスリン治療の優位性が示されている。優位性が示され症例数も多いことから、米国でのインスリンポンプ導入率は 1 型糖尿病の 40% に迫る。一方、本邦では 5~10% にとどまっているとされる。普及が未だ広がらない一方でデバイスの発展は進み、インスリンポンプに持続血糖モニタリングシステムを一体化させた Sensor augmented pump (SAP) が 2015 年 2 月に国内でも承認された。既に海外では SAP の長期成績が報告されており、頻回インスリン注射群と比して優位性が証明されている。

こういったデバイス導入の診療報酬が低かったことは元より、専門性や認定基準など大病院以外での導入ハードルの高さが、我が国における普及の足か

せとされている。今回、当院において SAP を導入する経験を得た。その実際を共有することで、大学病院とは異なる環境における 1 型糖尿病患者治療の課題と方向性を探る。

P3-52.

骨折治療に対する間欠的電磁場刺激の至適条件の検討

(社会人大学院博士課程 1 年整形外科)

○岩城 敬博

(整形外科)

澤地 恭昇、正岡 利紀

(茨城：整形外科)

宮本 泰典

近年、遷延治癒骨折や難治性の偽関節治療に物理刺激の有用性が示唆されている。物理刺激には超音波、電磁場、圧迫、温熱などがあり、超音波および電磁場による骨折治療は保険適応である。超音波は、1 日 20 分間骨折部に当てることで骨癒合の促進が実証されているが、骨折部に局所的に照射する必要があること、また深部には行き届きにくいといった欠点があり、その適応は限られる。一方、電磁場は骨折部位に対し広範囲に、さらに深部への効果が期待されるため、多様な骨折形態に対する治療応用が可能と考えられるが、1 日 8 時間と長時間の連続照射が必要であることが問題点としてあげられる。そこで我々は、間欠的電磁場刺激の至適条件を検討する。これまで当教室において、前骨芽細胞様細胞株 (MC3T3-E1) に対する電磁場刺激による骨芽細胞への分化応答についての基礎研究を行ってきており、刺激時間・頻度・刺激パターンの至適条件を検討し、近年、間欠的刺激の有用性を示唆する結果を得た。本研究では、刺激を与える細胞として、従来用いてきた MC3T3-E1 細胞株に加え、マウス頭頂骨由来の初代骨芽細胞およびヒトの間葉系幹細胞を用い、より臨床に近い実験条件を試みる。間欠的刺激の効果については、骨芽細胞の増殖および分化マーカーを指標に行う。また、電磁場刺激により活性化される細胞内情報伝達経路として知られる mTOR (mammalian target of rapamycin) およびその上流下流のシグナル伝達タンパク質のリン酸化を Western blot 法により評価する。今回は、骨折治療