

較検討した。

【対象と方法】 対象は心臓救急疾患のために PCPS を使用した連続 30 例 (男性 20 例、女性 10 例) で、疾患別に平均使用日数、PCPS 離脱率、合併症、使用開始前後の LVEF を検討した。

【結果】 症例全体の PCPS 平均使用日数は 3.9 日で、離脱率は 47% であった。合併症は 25% にみられ、主たるものは大腿送血カテーテル挿入部周囲の血腫による神経障害と下肢の阻血に起因するものであった。離脱率を疾患別にみると虚血性心不全では低率 (37%) であったが、急性心筋炎では全例が離脱可能であった。また PCPS 導入時の平均 LVEF は虚血性心不全では 35%、心筋炎で 30% であったが、離脱後では心筋炎において有意に高値であった。

【結論】 劇症型の心筋炎は PCPS により高い救命率が得られるので、使用時期を逸しないことが重要である。

5. 脳膿瘍を合併した僧帽弁位人工弁感染の一例

(外科第二) 谷 大輔、木島 豪、佐藤 和弘
三坂 昌温、池田 克介、清水 剛
平山 哲三、石丸 新

症例：42 歳男性。主訴：意識混濁等の神経障害を伴う発熱。
現病歴：1995 年 2 月頃より労作時呼吸困難、下腿浮腫出現。
MSr の診断にて 5 月 ■■■ MVR 施行 (Carbomedicus 25 mm)。以降近医にて内服 follow up 中であった。2001 年 12 月 ■■■ 意識混濁を伴う発熱 (38°C~39°C) を認めたため近医入院。抗生剤治療開始となる。その後全身浮腫が出現し心不全と診断し当院転院となる。経食道エコー施行したところ左心耳に新鮮血栓と人工弁座に可動性の疣贅を認めた。また頭部 MRI、CT にて脳膿瘍を認めた。脳膿瘍に対し抗生剤 (メロペネム) を投与した。この処置により WBC、CRP は低下、発熱も認めなくなったため 2 月 ■■■ Redo MVR 施行した (SJM 27 mm)。術後経過は良好で脳神経学的合併症は認められなかった。抗生剤の内服投与を継続し 2002 年 4 月 ■■■ 退院となった。脳膿瘍に合併した人工弁感染はまれであり、手術療法を含めた治療戦略を若干の考察を交え報告する。

6. 術中くも膜下出血 (SAH) を発症した活動性感染性心内膜炎 (AIE) の一例

(八王子・心臓血管外科)
前田 光徳、矢野 浩己、小長井直樹
高江 久仁、桑原 淳、工藤 龍彦

症例は 63 歳男性、熱発、腰痛を主訴に、近医にて内服加療を行っていたが、3 月中旬頃より症状増悪したため、精査加療目的にて当センター入院となった。心エコー上、僧帽弁、大動

脈弁に沈贅と高度の逆流を認め、体温 37.6 度、CRP 7.6 と炎症はまだ活動期であり、MRI にて化膿性椎間板炎を認めた。血培は陰性であり、起炎菌は不明であった。また、術前の頭部 CT、脳血管造影では、明らかな所見を認めなかった。このため、感染巣の除去と弁膜症の治療を目的として準緊急に二弁置換術 (AVR 21 mm CM 弁、MVR 27 mm CM 弁) を施行した。術後、覚醒遅延のため、頭部 CT 施行したところ SAH をみとめたが、同日施行した脳血管造影では明らかな動脈瘤、塞栓部位を確認できなかった。そしてさらに肺炎、呼吸不全を合併したが、rolling bed、抗生剤の変更等にて改善し、6 月初旬に退院した。AIE は院内死亡率 5.9~37% と高く、しかも感染性脳動脈瘤の破裂を生じる場合は死亡率 60~90% とさらに高率であり、今回術中に SAH を合併した AIE の 1 例を救命することができたので報告した。

7. AVR 10 年経過後縦隔出血を来した大動脈炎症候群の一例

(厚生中央・循環器科)
小野 晴稔、織田 勝敬、三橋 誉
近藤 博英、楽得 博之、平井 明生
中島 秀一
(新葛飾・心臓血管外科)
吉田 成彦
(同・循環器内科) 清水 陽一

症例は 64 歳女性。52 歳時に高度大動脈弁閉鎖不全にて弁置換術を受けている。この際、術前評価で閉鎖不全の原因が特定できなかったが、術中に脆弱な大動脈壁を認め、大動脈炎が基礎疾患であることが判明した。術直後よりステロイド投与が開始され、幸い人工弁の縫合不全は認めなかった。以後約 10 年間ステロイド投与がされていたが、赤沈・CRP の安定をもって投与は終了した。平成 13 年 10 月、自宅で突然呼吸苦出現し、近医救命センターに搬送された。ショック状態で人工呼吸管理開始、胸部 X-P で中央陰影の拡大があり CT で縦隔内血腫を疑い、血腫除去術を予定したが、血腫は 1 週間で自然消退し全身状態の改善を得た。この際、抗凝固療法が過度であったことが確認されている。縦隔血腫の原因として、3-DCT、大動脈造影をおこなったところ、バルサルバ直上に 2 個の動脈瘤の存在が確認された。術後 10 年以上たつ大動脈炎の経過の中でこのような合併症を経験したので報告する。